Dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale

Pas d'actualité AFM

Actualité AIM

<https://www.institut-myologie.org/2023/01/16/une-incidence-de-cancer-gastro-intestinal-plus-elevee-dans-la-fsh/>

Une incidence de cancer gastro-intestinal plus élevée dans la myopathie facio-scapulo-humérale ?

Une étude de petite ampleur concernant 31 adultes atteints de FSH et 30 non atteints a mis en évidence, à propos des manifestations extra-musculaires :

- l'incidence de cancer gastro-intestinaux (gastrique ou colorectal) serait plus élevée dans la FSH, à partir de l'âge de 40 ans, et non dépendante de la longueur des répétitions *D4Z4*.
- une absence de différence significative pour les autres cancers, non gastro-intestinaux (sans que ceux-ci ne soient cités).
- une fréquence plus élevée d'évènements cardiovasculaires, de diabète et d'hyperlipidémie chez les adultes atteints de FSH1.

Étant donné le petit nombre de participants, pouvant provoquer un biais statistique, de nouvelles études à plus grande échelle seront nécessaires pour confirmer ou non ces résultats.

Source

[*Gastrointestinal cancer occurs as extramuscular manifestation in FSHD1 patients.*](#)

Kurashige T, Morino H, Ueno H, et al.

J Hum Genet. 2022 (Nov)