

Myopathies inflammatoires

Pas d'actualité AFM

Actualité AIM

<https://www.institut-myologie.org/2023/02/16/les-anomalies-retiniennes-dans-les-myopathies-inflammatoires-sont-frequentes-et-a-ne-pas-meconnaitre/>

Les anomalies réiniennes dans les myopathies inflammatoires sont fréquentes et à ne pas méconnaître

Il n'est pas rare que les myopathies inflammatoires d'origine auto-immune aient une composante vasculaire dans leur expression clinique. Des chercheurs indiens et britanniques ont étudié ces phénomènes en soumettant la cohorte de patients nommée MyoCite à une batterie de tests ophtalmologiques.

- 43 adultes atteints de myopathie inflammatoire, principalement de dermatomyosite, ont été inclus dans l'étude,
- Des anomalies réiniennes (pâleur des vaisseaux, tortuosités accentuées...) ont été notées dans près de la moitié des patients, quel que soit le type de myosite.
- Elles s'accompagnaient le plus souvent d'une baisse significative de l'acuité visuelle.
- Aucune corrélation avec le type de myosite n'a pu être établie.

Les déterminants de l'atteinte réinienne dans les myosites restent, malgré cette étude, encore mal compris. Un examen ophtalmologique devrait faire partie du bilan chez tout patient atteint de myosite.

Source

[Retinal changes in patients with idiopathic inflammatory myopathies: A case-control study in the MyoCite cohort.](#)

Aggarwal R, Naveen R, Thakare D et al.
Front Med (Lausanne). 2022 Nov